

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skret szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności



Wpisany przez Administrator
czwartek, 23 stycznia 2020 14:43

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Hodowcy i osoby trzymające drobiu powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednio środki biosekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Ważnym jest od wypuszczenia ptaków na wybiegi i pozostawiać je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drobiu jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drobiu.

Pamiętaj! o zgłoszeniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, przełożony miasta) podjęciu wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne w województwie lubuskim

PW w Gorzowie Wlkp.	95 720 20 72
PW w Krośnie Odrz.	68 383 51 73
PW w Międzyzdrojach	95 741 22 38
PW w Nowej Soli	69 498 38 58
PW w Słubczynie	95 767 40 56
PW w Słubczynie-Kuj.	95 763 10 98
PW w Sulczynie	95 795 00 40
PW w Świeżowodzie	68 382 25 54
PW w Zielonej Górze	68 493 73 24
PW w Żaganiu	68 477 54 77
PW w Żarach	68 372 04 40
PW we Wschowie	68 356 51 00



WOJEWODA LUBUSKI

PORADNIK OGÓLNY

GRYPA PTAKÓW



opracowano na podstawie komunikatów
Głównego Lekarza Weterynarii
oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego



Wydział Biotechnologii i Zarządzania Rolnictwem
Lubelski Uniwersytet Medyczny, Centrum Włókn.
ul. Jagiellońska 8, tel. 91 711 32 49



Przeka grypa influenzy ptaków – ostro choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirus ginie w temperaturze 70°C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22°C i ponad 50 dni w 0°C.

Przeka grypa występuje na całym świecie i wyciek gatunków ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Dotychczas zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Wpływność z nich to odmienny biologicznie o niskiej patogenności (ang. *Low Pathogenic Avian Influenza*, LPAI). Mimo tego zaimię są dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczynić się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogenności (ang. *Highly Pathogenic Avian Influenza*, HPAI).

W ostatnim czasie (październik - grudzień 2016 r.) na terenie Europy po raz kolejny potwierdzono wystąpienie ognisk zakażeń wirusem wysoce patogennym grypy ptaków typu A(H5N8). Do zakażenia doszło zarówno u ptaków dzikich, jak i drobiu oraz u ptactwa w ZOO (Holandia). Przypadek zakażeń stwierdzono m.in. na Węgrzech, w Austrii,

Niemczech, Chorwacji, Danii i Szwajcarii, a także w Holandii i Polsce.

Wirus wystąpił w Europie już wcześniej (na przełomie 2014/2015 roku) i jego rozprzestrzenianie również było związane z sezonowymi migracjami ptaków dzikich. W porównaniu z ówczesnym okresem obecnie można się spodziewać zachowań i śmiertelności w populacji drobiu wodnego.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A(H5N8) u ludzi i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka jest bardzo niskie. Analizy genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasiem, bez szczególnego powinowactwa dla człowieka.

Jednakże w związku z tym, że wirus należy do grupy wirusów H5N1 i H5N6, które były przyczyną zachowań u ludzi, nie można wykluczyć możliwości zakażenia człowieka również tym wirusem. Dlatego też w związku z przewidywanymi i zapobiegawczymi środkami mającymi bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa (np. mięsami, jajkami, lekarz weterynarii, pracownicy farm, miłośnicy drobiu i obrobki mięsa drobiowego) powinni zachować szczególną ostrożność i stosować właściwe środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego oraz zachować higienę rąk.

Ponadto zaleca się, aby osoby pracujące na fermach, w których wystąpiły przypadki zakażeń u ptaków lub mające bezpośredni kontakt z zakażonymi ptactwem dzikim, prowadziły monitoring stanu swojego zdrowia przez 10 dni pod kątem wystąpienia objawów infekcji. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

UWAGA!!! W związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8) został wprowadzony zakaz targowiskowej sprzedaży drobiu i jaj konsumpcyjnych na terenie zapowietrzonym (3km od ogniska) i zagrożonym (10 km od ogniska). Drobiu i jaja należy kupować w sklepach i ślepiakach. W sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie jaja oznakowane, bądź w miejscu sprzedaży powinny się znajdować takie dane jak nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą lub imię, nazwisko i adres producenta jaja.

OBJAWY KLINICZNE
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe:
 - drgawki,
 - skręty,
 - paraliż nóg i skrzydeł,
- niezborność ruchów;
- duszność;
- silica,
- wykraczyny,
- biegunki,
- nagły spadek nieśności